

Календарь профилактических прививок для детей

Плановые возрастные точки федерального календаря. При пропуске срока врач составляет догоняющий график.

Первые 24 часа	Гепатит В	1-я вакцинация.
3-7-й день	Туберкулёз	Обычно БЦЖ-М; БЦЖ - при условиях порядка.
1 месяц	Гепатит В	2-я вакцинация.
2 месяца	Пневмококк	1-я вакцинация; гепатит В - 3-я доза только по схеме 0-1-2-12.
3 месяца	Дифтерия, коклюш, столбняк; полиомиелит; Hib	Первые вакцинации.
4,5 месяца	Дифтерия, коклюш, столбняк; полиомиелит; Hib; пневмококк	Вторые вакцинации.
6 месяцев	Дифтерия, коклюш, столбняк; полиомиелит; Hib; гепатит В	Третьи вакцинации; гепатит В по схеме 0-1-6.
12 месяцев	Корь, краснуха, паротит	Вакцинация; гепатит В - 4-я доза только по схеме 0-1-2-12.
15 месяцев	Пневмококк	Ревакцинация.
18 месяцев	Дифтерия, коклюш, столбняк; полиомиелит; Hib	1-е ревакцинации; ревакцинация Hib.
20 месяцев	Полиомиелит	2-я ревакцинация.
6 лет	Корь, краснуха, паротит; полиомиелит	Ревакцинация ККП; 3-я ревакцинация против полиомиелита.
6-7 лет	Дифтерия, столбняк; туберкулёз	2-я ревакцинация; БЦЖ туберкулиноотрицательным детям.
14 лет	Дифтерия, столбняк	3-я ревакцинация.
С 6 месяцев	Грипп	Ежегодно для категорий пункта 19 календаря.

Особые схемы 0-1-2-12 для гепатита В и ИПВ в 20 месяцев / 6 лет применяются только при условиях приказа; см. стр. 3.

Календарь профилактических прививок для взрослых

Возраст - только часть условия. Учитываются перенесённая инфекция, документированные дозы, профессия и медицинские условия.

С 18 лет	Дифтерия и столбняк	Ревакцинация каждые 10 лет от последней документированной ревакцинации.
18-55 лет	Гепатит В	Ранее не привитым: схема 0-1-6 месяцев.
Женщины 18-25 лет	Краснуха	Если не болели, не привиты, привиты однократно или сведений нет.
18-35 лет	Корь	Если не болели, не привиты, привиты однократно или сведений нет.
36-55 лет	Корь	Те же условия плюс работа в перечисленных календарём сферах.
Категории пункта 19	Грипп	Ежегодно; полный перечень приведён ниже.

Корь · группы 36-55 лет Медицинские и образовательные организации, торговля, транспорт, коммунальная и социальная сфера; вахта; госконтроль в пунктах пропуска через границу.	Грипп · кого включает календарь Беременные; 60+; призывники; люди с болезнями лёгких, сердца и сосудов, метаболическими нарушениями и ожирением; обучающиеся; профессии из пункта 19, включая МФЦ и госслужбу.
Если сведений нет Отсутствие документов не равно доказанному отсутствию иммунитета. Для дифтерии/столбняка при неизвестном анамнезе предусмотрена оценка антитоксического иммунитета.	Гепатит В · важная формулировка Пункт 16 относится к ранее непривитым в 18-55 лет. Если история неизвестна, сначала уточняют статус; курс не назначают автоматически только из-за отсутствия бумажной записи.

ПОЯСНЕНИЯ

Особые условия и границы

Эта страница расшифровывает пометки и отделяет федеральный календарь от индивидуальных, региональных и эпидемических показаний.

Гепатит В · схема 0-1-2-12 Для новорождённых при положительном HBsAg у матери, гепатите В, отсутствии результата обследования матери и других условиях пункта 11. Для остальных детей - 0-1-6.	Полиомиелит · тип вакцины Первые четыре введения - ИПВ. В 20 месяцев и 6 лет ИПВ вместо живой вакцины предусмотрена для перечисленных в пункте 12 медицинских групп.
Совместное введение Пункт 8 приложения № 3: вакцины национального и эпидемического календарей, кроме туберкулёзных, можно вводить в один день разными шприцами в разные участки тела. Инструкции препаратов имеют приоритет.	Что не входит в плановую таблицу Ротавирус, менингококк, ветряная оспа, гепатит А, ВПЧ и опоясывающий герпес не являются плановыми строками приложения № 1. Они могут иметь эпидемические, региональные или индивидуальные показания.

Перед прививкой

1. Осмотр	Медицинский осмотр и оценка противопоказаний в день вакцинации.
2. Информирование	Цель, риски, варианты, последствия и предполагаемый результат объясняются в доступной форме.
3. Согласие	Информированное добровольное согласие или отказ оформляются в медицинской документации.
4. Препарат	Проверяются возраст, показания, интервалы, противопоказания и совместимость по инструкции конкретной вакцины.

Нормативная основа: приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н в редакции приказа от 12.12.2023 № 677н; ФЗ № 157-ФЗ; ст. 20 ФЗ № 323-ФЗ; СанПиН 3.3686-21.

Взрослый 50 лет, сведений о прививках нет

Отсутствие документов не равно доказанному отсутствию иммунитета. Алгоритм ниже помогает определить, что уточнить и рассмотреть.

1. Дифтерия и столбняк Уточнить анамнез. При неизвестном анамнезе действующие санитарные правила предусматривают серологическую оценку противодифтерийного и противостолбнячного иммунитета. При завершённом курсе - ревакцинация каждые 10 лет.	2. Гепатит В Уточнить, был ли пациент привит ранее. Если установлено, что не привит, в 18-55 лет показан курс 0-1-6 месяцев. Отсутствие записи само по себе не доказывает, что пациент ранее не прививался.
3. Корь В 50 лет плановая вакцинация предусмотрена только для профессиональных групп риска, если пациент не болел, не имеет двух документированных доз или сведений. Беременность и значимая иммуносупрессия требуют отложить живую вакцину.	4. Грипп Ежегодно, если пациент относится к категории пункта 19: профессия, беременность, призыв, хроническое заболевание или другое условие. Одного возраста 50 лет для автоматического вывода недостаточно.

Можно ли ввести в один день?

Да, если каждая вакцина имеет самостоятельное показание, нет противопоказаний и это допускают инструкции. По пункту 8 приложения № 3 их вводят разными шприцами в разные участки тела. Вакцины для профилактики туберкулёза в это правило не входят. Не смешивать препараты в одном шприце.

Перед введением: медицинский осмотр, проверка противопоказаний, инструкции препарата и информированное добровольное согласие. Экстренная профилактика после травмы или контакта требует отдельного алгоритма.